



## PRIMA LEZIONE DI BIODINAMICA IN CAMPO

26 ottobre 2014

consulente: Michele Baio

### **Stato terreno:**

Asfittico, molto pestato, struttura colloidale appena accennata, 4/5 specie erbacee, vitalità espressa al 15 %

### **stato cumulo:**

Buono, trasformato al 50%.

### **Lavori da fare in campo:**

**Lavorazione** superficiale delle zone " calve" (le zone che hanno meno specie erbacee) semina abbondante di sovescio Landerschft Arcoiris,(10 kg)

**Cumulo:** girare sul posto e farlo più lungo e stretto, inoculare preparati + 30 l. di 500 K dato sopra dopo la valeriana, dopo 3 /4 settimane dovrebbe essere pronto da aspergere sul terreno. Posizionare le piante di sambuco sul lato ovest (ora sono sul lato sud)

Quando il cumulo sarà pronto bisogna aspergerlo sul terreno (2 dita su tutta la superficie) insieme al sovescio da interrare con un rastrello (non troppo profondo: in profondità il doppio della dimensione del seme); poi bagnare tutto a pioggia. In seguito irrorazione con preparato 500 di tutto il campo.

**Piantumazione:** spaccare le pareti e il fondo delle buche (spaccare la soletta che impedisce alle radici di entrare nel terreno). Sul fondo mettere 10 cm di cumulo con sopra 10 cm di terra. Spruzzare la buca con preparato 500 e aspergere tutto il terreno con preparato 500. Inzaffardare le radici delle piante e mettere a dimora la pianta lasciando il colletto sollevato di 5 cm dal filo del terreno; compattare con le mani il terreno mentre uno tiene la pianta. Irrigare attorno alla pianta una spanna fuori dalla buca per spingere le radici ad allungarsi per cercare l'acqua e l'albero si salda meglio al suolo. Attorno al piede della pianta lasciare 20-30 cm di terra nuda pacciamandola con la paglia pressata (da togliere quando piove e rimetterla quando smette di piovere)

Fare i camminamenti interfila in modo da evitare che si calpesti tutto il campo.

**Trattamento terreno:** da fine Febbraio a Giugno fare 6 trattamenti del terreno con il preparato 500, 2 trattamenti del terreno con il 501, 1 trattamento con il cornozolfo, 1 aspersione di 500 il 24 Dicembre al pomeriggio, il 6 Gennaio dare il preparato t, a Marzo un decotto di equisetto e dopo una settimana quello di ortica.

A luglio, dopo che i frutti si sono formati, dare 1 trattamento di 501 e 1 trattamento di CZ.

Da ottobre in avanti pasta tronchi sulle piante man mano che perdono le foglie.

**Siepe:** spostare le piante quando perdono le foglie. Attenzione a pacciamare con paglia attorno alle piante in modo che non cresca addosso alla pianta l'erba e faccia mettere delle radichette alte sui tronchi.

**Lamponi:** costruire una spalliera in mezzo e mettere una di fronte all'altra le piante con la spalliera e portare le piante a toccarsi in modo che si costruiscano l'un l'altra un sostegno

Mantenere solo una pianta alla volta, i polloni separarli dal resto con la radice e ripiantarli (immergendo le radici in corno letame 50%+ urina di vacca 50% per 30 minuti e poi metterle a dimora)